

1 POMÓIDEAS

1.1 Bichado da Fruta

O voo da praga mantém-se intenso com elevadas capturas de adultos nas armadilhas sexuais, com condições climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento.

Dado o período de risco que a praga apresenta, aconselhamos a renovação do tratamento.

1.2 Ácaros (Aranhão vermelho)

No presente ano verificamos em algumas parcelas, níveis populacionais elevados deste inimigo. Nesta altura o fotoperíodo é inferior a 14 horas luz, pelo que as fêmeas dão início às posturas de Inverno.

Mantenha a vigilância da sua parcela e avalie o nível económico de ataque, ponderando a melhor estratégia para baixar o nível de infestação para este e o próximo ano.

1.3 Mosca da Fruta (*Ceratitis capitata*)

No posto biológico de Gouveia, foram capturados adultos da praga em armadilhas de monitorização.

Aconselhamos a realização de tratamento, para as variedades em mudança de cor, podendo utilizar produto que combata em simultâneo o Bichado.

fosmete - 1 única aplicação – IS -28 dias

1.4 Doenças de conservação

Algumas doenças de conservação devem ser tratadas no pomar, dado que algumas variedades estão aproximar-se da época de colheita, aconselhamos a efectuar tratamento com uma das seguintes substâncias activas.

Quadro 1- Fungicidas autorizados para tratamentos de pré- colheita

Substancia activa	Nomes comerciais	Intervalo de segurança (Dias)
Fosetil de Alumínio	Aliete flash, Etylit premier, fosbel80-PM, Alfil	3
Tirame	Tianosan, Tidora G, TM-80, Pomarsol ultra D.	35 (1)
Tiofanato de metilo	Tocin WG	7 (2)

(1) Não efectuar mais de quatro tratamentos após fim da floração

(2) Não efectuar mais de dois tratamentos

Nota: Senhor Agricultor leia sempre o rótulo do produto que vai aplicar e tenha em atenção. o **Intervalo de Segurança - período de tempo em dias, que deve decorrer desde a aplicação do produto até à colheita -**.

O Responsável Estação Avisos Guarda

Joaquim Santos Almeida