

Estação de Avisos de Leiria

ÍNDICE

Circular nº 12 /2010

LEIRIA, 16 de JULHO

POMÓIDEAS

BICHADO – Quem não efectuou o tratamento aconselhado na última circular, deverá fazê-lo com um produto de acção larvicida.

COCHONILHA S. JOSÉ – Já se observaram as eclosões das larvas da segunda geração. É nesta fase que a praga se encontra mais sensível aos tratamentos. Nos pomares onde esta cochonilha se encontra localizada, deverá efectuar um tratamento. Procure aplicar um produto que combata simultaneamente o bichado.

ARANHIÇO VERMELHO - Os ataques desta praga têm sido esporádicos, também os calores verificados não têm aumentado muito a praga, no entanto, deve estar atento e se observar entre 50 a 75% de folhas de macieiras e 50% de folhas de pereira com a presença desta praga, deverá tratar com um acaricida específico.

VINHA

OÍDIO – Com as manhãs orvalhadas e o tempo quente durante o dia, este fungo encontra condições óptimas para o seu desenvolvimento. Continue a ter a vinha protegida até ao pintor.

OLIVAL

MOSCA DA AZEITONA – Apesar do voo já se ter iniciado, ainda não se aconselha o tratamento. Deverá aguardar por novas indicações.

Equipa técnica:

José Batalha

Marta Caetano

