

Estação de Avisos de Leiria

ÍNDICE

Circular nº 13 /2010

## POMÓIDEAS

**BICHADO** – Esta praga continua activa em grande parte dos pomares da região. Vai ter início a sua terceira geração . Deverá observar 1000 frutos e tratar quando 0,5 a 1% (5 a 10 frutos) estiverem atacados.

**ARANHIÇO VERMELHO** – O aranhico desenvolve-se bem em tempo quente e seco. Observe 100 folhas do terço superior dos ramos do seu pomar e se observar 45 a 50% de folhas com formas móveis, em macieira, ou 30%, em pereira, deverá tratar.

**MOSCA DA FRUTA** – Ainda não observámos nas nossas armadilhas capturas que justifiquem um tratamento, nem frutos com picadas. Aguarde por novas informações.

## VINHA

**MÍLDIO** – O fungo nesta fase já não causa problemas a nível dos cachos, no entanto, ele continua activo nas folhas localizadas na ponta dos ramos. A fim de eliminar esse inoculo que irá ficar nas folhas no chão para o próximo ano e também para ajudar no melhor atempamento dos pampans, deverá realizar um tratamento à base de cobre.

LEIRIA, 10 de AGOSTO

**BOTRYTIS (Podridão)** – Nas castas e nos locais mais habitualmente atacados por este fungo deverá ser feito um tratamento 3 a 4 semanas antes da vindima, molhando bem os cachos.

**TRACA** – está a ter início a terceira geração desta praga. Nas vinhas normalmente mais atacadas, deverá ser feito um tratamento, preferencialmente a partir do dia 15.

## OLIVAL

**MOSCA DA AZEITONA** – As capturas nos nossos postos biológicos não têm sido elevadas e esta praga não resiste a temperaturas tão elevadas e humidade relativa baixa, como se tem registado nos últimos dias. Aguarde por novas indicações.

Equipa técnica:  
*José Batalha*  
*Marta Caetano*

